

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ВК. №

578
10 07 2015

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

До
Български лекарски съюз
бул. „Акад. Иван Гешов” 15
София
1431
България

Относно:

Предложение за разпространение до всички регионални колегии на Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС) в България

ПСМС за риска от диабетна кетоацидоза при употребата на лекарствени продукти от групата на SGLT2 инхибиторите (канаглифлозин, дапаглифлозин и емпаглифлозин)

**Forxiga (дапаглифлозин)
Xigduo (дапаглифлозин/метформин)
Invokana (канаглифлозин)
Vokanamet (канаглифлозин/метформин)
Jardiance (емпаглифлозин)
Synjardy (емпаглифлозин/метформин)**

02/07/2015

Уважаеми медицински специалисти,


С настоящото писмо, предоставяме на Вашето внимание Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС) във връзка с риска от диабетна кетоацидоза при употребата на лекарствени продукти от групата на SGLT2 инхибиторите (канаглифлозин, дапаглифлозин и емпаглифлозин).

Бихме желали да отправим предложение за разпространение на гореспоменатото ПСМС до всички регионални колегии, по Ваша преценка.

Приложено:

1. ПСМС за риска от диабетна кетоацидоза при употребата на лекарствени продукти от групата на SGLT2 инхибиторите (канаглифлозин, дапаглифлозин и емпаглифлозин).

С уважение,



Д-р Яхин Хавличек
Ръководител клон-България
Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ-клон България



д-р Галина Петкова-Тодорова
Ръководител корпоративни и медицински дейности
Джонсън & Джонсън България ЕООД
Упълномощен представител за България на
Janssen-Cilag International NV, Белгия



Станислава Кръстева
Местно лице по „Лекарствена безопасност“
АстраЗенека България ЕООД